

# Avertissements agricoles



PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN GÉNÉRAL N° 18

Le 03 Aout 1984

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

DLP - 3-8-84398477

## VIGNE

**BOTRYTIS** : UN TRAITEMENT AVANT LE DEBUT DE LA VERAISON EST CONSEILLE.

Les traitements spécifiques avec des imides cycliques (RONILAN, ROVRAL, KIDAN, SUMISCLEX) ont été déconseillés dans nos bulletins antérieurs aux stades "chute des capuchons" et "fermeture de la grappe".

Par contre, si vous utilisez une de ces spécialités, un traitement devra obligatoirement être réalisé ces prochains jours, avant le début de la véraison. (Ne pas attendre la pleine véraison). Si malgré nos conseils, vous avez utilisé un imide à la "fermeture de la grappe", le traitement début véraison n'est pas utile. Attendez le stade "3 semaines avant récolte", nous vous précisons à ces dates l'opportunité d'une telle application.

**MILDIOU** : ASSURER UNE PROTECTION AVEC UN PRODUIT CUPRIQUE.

Rappel des bulletins antérieurs. Cette protection cuprique devra être apportée avant les prochains orages. On renouvellera cette protection en cas de lessivage par une pluie de 20 à 25mm.

**OIDIUM** : DES ATTAQUES PARFOIS TRES IMPORTANTES.

Sur vigne mal protégée, des attaques très importantes ont été observées sur le littoral varois (HYERES).

La protection doit se poursuivre jusqu'à la véraison.

**TORDEUSES** : FIN DU SECOND VOL EN TOUTE ZONE.

Nous rappelons pour les zones très tardives, (TOURVES, ST-MAXIMIN, BRIGNOLES) la date du traitement préventif : fin Juillet (C.F. bulletin du 19.07). En général les dépôts de pontes sont peu élevés. Si cette application n'a pas été effectuée, vérifiez en fin de semaine prochaine la présence éventuelle de chenilles. Vous interviendrez alors avec un produit à action de choc (Parathion, méthomyl) que si plus de 10 % des grappes sont atteintes.

En zones précoces, le troisième vol n'a pas débuté.

## ARBORICULTURE

ATTENTION AU DOSAGE ET AU DELAI D'EMPLOI DES PRODUITS  
AVANT RECOLTE

**ACARIENS ROUGES** : SURVEILLER LA POPULATION (seuil).

Pour l'abaisser si nécessaire avant la mi-aout, date de dépôt des premiers oeufs hivernants.

**PUCERONS** : INTERVENIR DES LES PREMIERS DEGATS ou LA PRESENCE DU PECERON LANIGERE (pommier).

Sur ce dernier, utiliser de préférence : pirimicarbe (Pirimor) ou vamidothion (Kilval, sépaphid) suivant la date de la récolte. Ces matières actives épargnent mieux les auxiliaires.

**COSSUS** : RENOUELER LA PROTECTION (voir bulletin du 06.07.84)

**OIDIUM** : SURVEILLER LES ESPECES A VARIETES SENSIBLES POUR INTERVENIR SI NECESSAIRE.

7299

Quartier Cantarel - B.P. 95 84140 MONTFAVET - Téléphone : (90) 88.21.83...  
ABONNEMENT ANNUEL : EDITION GENERALE 100 F - TOMATE 45 F - VITI. VAR 45 F - CERISIER 45 F